

## Bilag 1: Fokuserede spørgsmål

- 1) Lokalbehandling med til non-steroidt antiinflammatorisk middel immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund.

<b>Population</b>	Immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund	
<b>Lægemiddel</b>	<b>Formulering</b>	<b>Sammenligningsdosis</b>
Diclofenac	Gel, 30 mg/g (3%)	2 gange dagligt i 2-3 mdr.
<b>Outcome</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Mindste kliniske relevante forskel</b>
<i>Effekt</i>		
Total fjernelse af aktinisk keratose	8 uger efter behandling	Ingen synlig aktinisk keratose
<i>Bivirkninger</i>		
Hudreaktioner på applikationsstedet	Under behandling	Synlige hudforandringer
Frafald grundet bivirkninger	Under behandlingen	

- 2) Lokalbehandling med immunmodulerende middel til immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund.

<b>Population</b>	Immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund	
<b>Lægemiddel</b>	<b>Formulering</b>	<b>Sammenligningsdosis</b>
Imiquimod	Creme 50 mg/g (5%)	3 gange ugentligt i 4 uger, 4 uger uden, igen 3 gange ugentligt 4 uger.
Imiquimod	Creme 37,5 mg/g (3,75%)	1 gang dagligt i 2 uger, 2 uger uden, igen 1 gang dagligt i 2 uger.
<b>Outcome</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Mindste kliniske relevante forskel</b>
<i>Effekt</i>		
Total fjernelse af aktinisk keratose	8 uger efter behandling	Ingen synlig aktinisk keratose
<i>Bivirkninger</i>		
Hudreaktioner på applikationsstedet	Under behandling	Synlige hudforandringer

- 3) Lokalbehandling med cytostatikum i kombination med salicylat til immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund.

<b>Population</b>	Immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund	
<b>Lægemiddel</b>	<b>Formulering</b>	<b>Sammenligningsdosis</b>
5-Fluorouracil, Salicylsyre	Kutanopløsning 5 mg/g + 100 mg/g	1 gang dagligt i 12 uger
<b>Outcome</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Mindste kliniske relevante forskel</b>
<i>Effekt</i>		
Total fjernelse af aktinisk keratose	8 uger efter behandling	Ingen synlig aktinisk keratose
<i>Bivirkninger</i>		
Hudreaktioner på applikationsstedet	Under behandling	Synlige hudforandringer

- 4) Lokalbehandling med diterpen ester til immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund.

<b>Population</b>	Immunkompetente patienter med aktinisk keratose i ansigt og hårbund	
<b>Lægemiddel</b>	<b>Formulering</b>	<b>Sammenligningsdosis</b>
Ingenolmebutat	Gel 150 µg/g	1 gang dagligt 3 dage i træk
<b>Outcome</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Mindste kliniske relevante forskel</b>
<i>Effekt</i>		
Total fjernelse af aktinisk keratose	8 uger efter behandling	Ingen synlig aktinisk keratose
<i>Bivirkninger</i>		
Hudreaktioner på applikationsstedet	Under behandling	Synlige hudforandringer

- 5) Lokalbehandling med non-steroidt antiinflammatorisk middel til immunkompetente patienter med aktinisk keratose på krop.

<b>Population</b>	Immunkompetente patienter med aktinisk keratose på krop	
<b>Lægemiddel</b>	<b>Formulering</b>	<b>Sammenligningsdosis</b>
Diclofenac	Gel, 30 mg/g (3 %)	2 gange dagligt i 2-3 mdr.
<b>Outcome</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Mindste kliniske relevante forskel</b>
<i>Effekt</i>		
Total fjernelse af aktinisk keratose	8 uger efter behandling	Ingen synlig aktinisk keratose
<i>Bivirkninger</i>		
Hudreaktioner på applikationsstedet	Under behandling	Synlige hudforandringer

- 6) Lokalbehandling med cytostatikum i kombination med salicylat til immunkompetente patienter med aktinisk keratose på krop.

<b>Population</b>	Immunkompetente patienter med aktinisk keratose på krop	
<b>Lægemiddel</b>	<b>Formulering</b>	<b>Sammenligningsdosis</b>
5-Fluorouracil, Salicylsyre	Kutanopløsning 5 mg/g + 100 mg/g	1 gang dagligt i 12 uger
<b>Outcome</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Mindste kliniske relevante forskel</b>
<i>Effekt</i>		
Total fjernelse af aktinisk keratose	8 uger efter behandling	Ingen synlig aktinisk keratose
<i>Bivirkninger</i>		
Hudreaktioner på applikationsstedet	Under behandling	Synlige hudforandringer

7) Lokalbehandling med diterpen ester til immunkompetente patienter med aktinisk keratose på krop.

<b>Population</b>	Immunkompetente patienter med aktinisk keratose på krop	
<b>Lægemiddel</b>	<b>Formulering</b>	<b>Sammenligningsdosis</b>
Ingenolmebutat	Gel 500 µg/g	1 gang dagligt 2 dage i træk
<b>Outcome</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Mindste kliniske relevante forskel</b>
<i>Effekt</i>		
Total fjernelse af aktinisk keratose	8 uger efter behandling	Ingen synlig aktinisk keratose
<i>Bivirkninger</i>		
Hudreaktioner på applikationsstedet	Under behandling	Synlige hudforandringer

Høringsversion